

INFORMATIONS MEDICALES AVANT REALISATION D'UNE BIOPSIE DES GLANDES SALIVAIRES ACCESSOIRES

Madame, Monsieur,

La **biopsie des glandes salivaires accessoires** est une procédure consistant à prélever de petites glandes salivaires au niveau de la lèvre inférieure.

Afin que vous soyez clairement informé du déroulement de cette intervention, nous vous demandons de **lire attentivement ce document d'information**. Votre chirurgien est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

N'oubliez pas de dire à votre chirurgien les traitements que vous prenez régulièrement, et en particulier Aspirine, anticoagulants... N'oubliez pas de signaler si vous avez déjà présenté des manifestations allergiques, en particulier médicamenteuses. Enfin n'oubliez pas d'apporter, lors de l'hospitalisation, les documents médicaux en votre possession : prises de sang, examens radiologiques notamment.

BUT DE L'INTERVENTION

Cette intervention a pour but de prélever des petites glandes intervenant dans la production de la salive. Ces dernières peuvent en effet être atteintes dans différentes pathologies, comme la sécheresse buccale mais aussi dans certaines maladies auto-immunes (syndrome de Gougerot-Sjögren, amylose, sarcoïdose...).

Les glandes retirées seront analysées par un(e) médecin spécialiste de façon à pouvoir préciser au mieux le diagnostic des pathologies précédemment citées.

REALISATION DE L'INTERVENTION

Il est recommandé au patient de veiller à avoir une bouche propre avant l'intervention. Pour cela, il est préférable d'utiliser un bain de bouche et de se

brosser les dents avant de se rendre à son rendez-vous.

Pendant l'intervention, le patient est installé en position semi-assise.

Le chirurgien commence par réaliser une anesthésie locale au niveau du site de prélèvement, sur la lèvre inférieure, à l'aide d'une aiguille fine. L'anesthésie est efficace quelques secondes à minutes après l'injection du produit.

Le chirurgien réalise ensuite au niveau de la zone anesthésiée une incision d'environ un centimètre au niveau de l'intérieur de la lèvre inférieure, lui permettant de prélever, selon les cas, entre 3 et 6 glandes salivaires accessoires, chacune mesurant environ 2 ou 3 millimètres.

La plaie est ensuite en règle générale refermée à l'aide d'un fil se résorbant tout seul en quelques jours. Il est aussi possible de la laisser cicatriser par elle-même sans réaliser de points de suture.

RISQUES IMMEDIATS

Les complications sont très rares.

La survenue d'un saignement ne s'arrêtant pas tout seul ou d'une infection locale (apparition d'une rougeur de la lèvre, de douleurs, d'un écoulement) doivent vous faire recontacter votre médecin.

La douleur occasionnée par le geste est généralement minimale et bien soulagée par les antalgiques simples comme le PARACETAMOL.

Il arrive parfois que la zone de prélèvement soit anesthésiée ou moins sensible pendant quelques jours à semaines, mais la récupération est en règle générale systématique.

RISQUES SECONDAIRES

Elles sont exceptionnelles.

Un kyste mucoïde (aussi appelé mucocèle) peut apparaître au niveau de la zone de prélèvement et nécessiter une exérèse chirurgicale en cas de persistance.

La cicatrice est généralement ferme au début de la cicatrisation mais peut parfois le rester durablement. Des massages peuvent être réalisés pour assouplir la cicatrice. Cette dernière est quoi qu'il en soit généralement invisible, puisque réalisée à l'intérieur de la lèvre.

QUE FAIRE APRES UNE BIOPSIE DES GLANDES SALIVAIRES ACCESSOIRES

Il est recommandé suite à l'intervention de maintenir une bonne hygiène buccale, de privilégier pendant quelques jours une alimentation froide ou tiède et d'éviter les aliments acides ou épicés pouvant occasionner des brûlures au niveau de la cicatrice.

En cas de saignement au niveau du site de prélèvement, il est recommandé de comprimer le point de saignement avec des compresses, ce qui est généralement efficace. En cas d'inefficacité de cette manœuvre, contactez votre chirurgien.